



# LUMENCOL

## POLIETILENGLICOL 3350

POLVO PARA RECONSTITUIR

### Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado sólo para su problema médico actual. No debe dárselo a otras personas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

### Contenido del prospecto:

1. Qué es LUMENCOL y para que se utiliza?
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar LUMENCOL?
3. Cómo tomar LUMENCOL?
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de LUMENCOL.
6. Contenido del envase e información adicional.

### 1. Qué es LUMENCOL y para que se utiliza?

LUMENCOL pertenece a una clase de laxante llamado osmótico. Aumenta la cantidad de agua en el tracto intestinal que estimula el movimiento y ablanda las heces para que pasen fácilmente; favoreciendo de este modo las evacuaciones. LUMENCOL también contiene potasio, sodio y otros minerales para reemplazar los electrolitos que salen del cuerpo con las heces. LUMENCOL está indicado en la preparación del colon previo a estudios endoscópicos, radiológicos y cirugía colorrectal y para limpiar el intestino antes de otros procedimientos intestinales.

### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar LUMENCOL?

No debe usar este medicamento si tiene perforación en el intestino, obstrucción intestinal o estreñimiento severo, o colitis o megacolon tóxico.

Si Ud. padece de algunas de estas condiciones, consulte a su médico para que evalúe si debe modificar la dosis para que pueda usar este medicamento con seguridad.

No use este medicamento si es alérgico al Polietilenglicol o a cualquier solución con electrolitos.

Informe a su médico si está tomando algún medicamento con o sin prescripción, incluidas vitaminas, suplementos nutritivos y/o productos herbarios.

Las personas con trastornos alimenticios (anorexia o bulimia) no deben usar LUMENCOL sin la aprobación de su médico.

Informe a su médico si tiene: náuseas o vómitos, dificultad al tragar, historial de obstrucción intestinal, diverticulitis, colitis ulcerativa, u otra enfermedad crónica del intestino.

### Advertencias y Precauciones:

**Embarazo:** categoría C del embarazo por la FDA. LUMENCOL solo debe ser administrado a pacientes embarazadas en caso de clara necesidad.

No se conoce si LUMENCOL causará daño al feto. Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada mientras está usando este medicamento.

**Lactancia:** se desconoce si LUMENCOL se distribuye en la leche materna o si puede causar daño al bebe lactante. Informe a su médico si está amamantando a su bebé.

**Pediatría:** no se ha establecido la seguridad y efectividad en niños.

**Interacciones medicamentosas:** los medicamentos administrados hasta una hora antes de comenzar la ingesta de LUMENCOL pueden sufrir modificaciones en su absorción o ser limpiados del tracto gastrointestinal, por lo tanto no ser absorbidos.

### 3. Cómo tomar LUMENCOL?

LUMENCOL viene como polvo para ser mezclado con agua potable y tomado por vía oral. Agite bien el líquido justo antes de medir la dosis. Siga exactamente las instrucciones del médico tratante. No tome este medicamento en cantidades mayores o menores a las indicadas o por más tiempo de lo recomendado. Respete los intervalos de tiempo indicados. Para mejores resultados, ingiera este medicamento 3 a 4 horas después de haber comido. **No tome esta medicina si han pasado menos de 2 horas de haber comido algo sólido.**

No añada ningún saborizante a este medicamento como azúcar, miel, edulcorante, jugo de fruta u otras bebidas. Se recomienda consumir bien frío. Conserve este medicamento preparado en la heladera.

Tome abundante líquido antes, durante y después del tratamiento.

### 4. Posibles efectos adversos

LUMENCOL puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- Malestar estomacal.

- Retortijones.

- Hinchazón abdominal.

- Gases.

**Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Los siguientes síntomas son pocos comunes, pero si Ud. experimenta cualquiera de ellos, llame a su médico inmediatamente:**

- Dolor intenso de estómago, repentino y severo.

- Fiebre.

- Diarrea severa, sangrado rectal, heces color rojo brillante.

No tiene movimiento intestinal dentro de las 2 horas después del uso.

- Náuseas, ahogo o vómito.

- Urticaria.

### 5. Conservación de LUMENCOL:

Conservar bien tapado, en lugar fresco y seco. Temperatura ambiente hasta 30°C.

Mantener la solución reconstituida en la heladera. Usarla dentro de las 48 horas. Desechar la solución sobrante.

### 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACION ADICIONAL:

**Fórmula:** Cada envase de LUMENCOL contiene: Polietilenglicol 3350 240 g; cloruro de sodio 5,84 g; cloruro de potasio 2,98 g; bicarbonato de sodio 6,72 g; sulfato de sodio anhidro 22,72 g; esencia de ananá 1,93 g.

Cuando se reconstituye con agua, la solución oral final contiene: 125 mEq/l de sodio; 10 mEq/l de potasio; 20 mEq/l de bicarbonato, 80 mEq/l de sulfato; 35 mEq/l de cloruro y 18 mEq/l de polietilenglicol 3350. La solución reconstituida es isosmótica.

**Presentación:** Bidón conteniendo polvo para preparar 4 litros de solución de administración oral.

**Mantener alejado del alcance de los niños.**

**Este producto debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica.**

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234"

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.375.

Dirección Técnica: M. Laura Rodríguez Ullate - Farmacéutica.

**LABORATORIO AUSTRAL S.A.**

Av. Olascoaga 951, Neuquén, Argentina.

0800-333-6638

Fecha última revisión: Feb/2014.

300525/RO

 **SANITAS**



LUMENCOL - Etiqueta Dorso

Medidas: 170 x 150 mm

Radio: 3 mm

IMPRIME:



PANTONE COOL GRAY 11 C