



FOSFACOL 1F / FOSFACOL 2F

FOSFATO MONOSÓDICO

FOSFATO DISÓDICO

SOLUCIÓN

Industria Argentina - Venta bajo receta

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA

Cada 100 ml de solución contiene: Fosfato monosódico 48 g; Fosfato disódico 18 g.

Excipientes: Sacarina sódica 55 mg; Agua destilada c.s.p. 100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Laxante suave o purgante.

INDICACIONES

Preparación del colon para estudios radiológicos, exámenes endoscópicos o cirugía de colon o recto.

Tratamiento de la constipación ocasional.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Preparación del colon – Purgante

Para adultos y niños mayores de 12 años: 45 ml diluidos en medio vaso de agua fría administrados el día previo al examen, seguidos de tres vasos de agua fría hasta la hora de acostarse.

La mañana del estudio ingerir otros 45 ml de FOSFACOL 1F / FOSFACOL 2F en medio vaso de agua fría.

Se recomienda que la administración se haya completado tres horas antes del estudio.

Laxante

Adultos y niños mayores de 12 años: 4 cucharaditas de té (20 ml).

Niños de 10 a 12 años: 2 cucharaditas de té (10 ml).

Niños de 5 a 10 años: 1 cucharadita de té (5 ml).

Diluir la dosis recomendada en medio vaso de agua fría y beberlo. A continuación, ingerir otro vaso de agua fría.

Se recomienda tomar en ayunas, al menos 30 minutos antes del desayuno o al acostarse.

FOSFACOL 1F / FOSFACOL 2F actúa entre 30 minutos y 6 horas después de su administración, dependiendo de la dosis.

Se recomienda no exceder estas dosis, salvo indicación médica.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia cardíaca sintomática. Insuficiencia renal crónica terminal. Hiperfosfatemia. Hipernatremia. Íleo. Megacolon tóxico. Dietas con restricción de sodio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Utilizar con precaución en pacientes con megacolon congénito o insuficiencia cardíaca congestiva porque puede producir Hipernatremia. Por la misma razón, utilizar con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática. En los pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda debe monitorearse el fósforo sérico, ya que el medicamento puede conducir a hiperfosfatemia. Utilizar con precaución en

embarazo, lactancia y en pacientes que presentan ascitis, infarto agudo de miocardio y alteraciones de la función renal, ya que el uso prolongado de este medicamento puede producir hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipernatremia y acidosis.

FOSFACOL 1F / FOSFACOL 2F contiene fosfato sódico dibásico y monobásico por lo que existe riesgo potencial de hipernatremia y deshidratación consecuente, particularmente en niños con megacolon.

Cuando resulte apropiado se recomienda la ingestión adicional de líquidos. Cada 4 cucharaditas de té (20 ml) contienen 96,4 miliequivalentes de sodio. No contiene azúcar.

Interacciones medicamentosas

No administrar simultáneamente sales de aluminio, calcio y magnesio.

Advertencias generales para laxantes

No utilice laxantes cuando tenga vómitos, náuseas o dolor abdominal, a menos que se lo indique el médico. Si observa cambios significativos en los hábitos intestinales que persisten durante un período de dos semanas consulte a un médico antes de usar un laxante. Ante sangrado rectal o imposibilidad de evacuación interrumpa el uso del producto y consulte a un médico.

Los laxantes no pueden utilizarse durante más de una semana a menos que estén indicados por el médico.

El uso frecuente o prolongado de los laxantes puede producir dependencia.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente puede producir hipernatremia, hiperfosfatemia, hipocalcemia o deshidratación.

SOBREDOSIFICACIÓN

No deben excederse las dosis recomendadas, pues la sobredosificación puede producir efectos colaterales serios.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 // 4658-7777

Hospital Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115 // 4362-6063

CONSERVACIÓN

Temperatura ambiente, desde 15 °C hasta 30 °C. Conservar en envase cerrado. Proteger del congelamiento.

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

FOSFACOL 1F: envase conteniendo 1 frasco por 45 ml de solución oral.

FOSFACOL 2F: envase conteniendo 2 frascos por 45 ml de solución oral c/u.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado n.º 51.662.

Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.

Carhué 1096, Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: Federico Montes de Oca, Farmacéutico.